



Comunicat de presă-Masuri de prevenire pentru infecția cu virusul West Nile

Ținând cont de contextul climatic favorabil dezvoltării vectorilor (ploi urmate de perioade de încălzire precum și inundații în unele zone) dar și confirmarea celor 5 cazuri de meningo-encefalită cu virus West Nile în România și a celor 19 cazuri de infecție virus West Nile în țările Uniunii Europene precum și a celor 29 cazuri în Serbia în județe din Banatul de vest la graniță cu România, informăm populația cu privire la infecția cu virusul West Nile.

Este o boala infectioasa produsa de virusul West Nile care este transmis prin intepatura de tantar. La om, in majoritatea cazurilor, infectia are manifestari subclinice, iar cand acestea sunt tipice, spectrul clinic si severitatea pot fi foarte variate.

Nu există un tratament specific al acestei boli și nici un vaccin care să prevină, motiv pentru care împiedicarea înmulțirii și evitarea înțepăturilor de țânțar sunt principalele măsuri de prevenire a îmbolnăvirii.

Ce trebuie să știm despre țânțari?

Țânțarii transmit agenți patogeni care produc îmbolnaviri la om și la animale. Bolile cele mai răspândite sunt arbovirozele, dintre aceste făcând parte și infecția cu virusul West Nile. Pentru a-și depune ouăle femelele de țânțari se hrănesc cu sânge. În timp ce se hrănesc cu sânge ele se infectează cu agenți patogeni de la om sau animale sau îi transmit acestora. Țânțarii trăiesc și se dezvoltă în preajma noastră, unde îi găsim fie sub forma de larve (ouă), fie sub forma adultă.

Larvele de țânțari se găsesc:

- în apa acumulată în subsolurile blocurilor;
- în apa care nu se scurge din canalizarea înfundată;
- în bălțile care se formează în apropierea locuințelor, din apa care curge din conductele sparte și din alte instalații neîntreținute;
- în apa de ploaie păstrată în butoaie/vase în curte;
- în apa acumulată în recipiente vechi aruncate la întâmplare în preajma locuințelor (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc);
- în apa din gropile și șanțurile de pe șantiere sau din locuri unde s-a lucrat la instalații.

Țânțarii adulți zboară în preajma locuințelor, mai ales dimineața devreme sau în amurg, căutând posibilitatea de a se hrăni cu sânge. Țânțarii, pentru a se hrăni cu sânge, intră în locuințe prin ferestrele lăsate deschise, prin casa scării, prin orificiile de aerisire unde pot rămâne peste noapte. În timpul zilei se adăpostesc în locuințe, subsoluri, poduri, cotețe, grajduri, magazii, frunzișul copacilor.

Cum putem împiedica țânțarii să se înmulțească în preajma noastră?

- prin evacuarea apei din subsoluri;
- prin repararea instalațiilor de apă și canalizare din subsoluri și din apropierea locuințelor;
- prin renunțarea la păstrarea apei în butoaie în curte sau să le protejăm de accesul țânțarilor acoperindu-le bine cu capace potrivite;
- prin evitarea aruncării la întâmplare a obiectelor care nu ne mai trebuie, în care apa poate stagna (cutii de conserve, cauciucuri de automobile, jucării etc);
- prin îndepărtarea permanentă a gunoaielor menajere în care se adăpostesc țânțarii;

Cum să evităm înțepăturile de țânțari?

- purtând îmbrăcăminte cu maneci lungi și pantaloni lungi, dacă ieșim seara din locuințe sau ieșim seara în parc la plimbare sau când mergem în pădure, la pescuit;
- utilizând substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor comercializate în farmacii (DEET, icaridină/picardină, IR 3535), în concordanță cu instrucțiunile de pe etichetă, pe care să le aplicăm pe părțile descoperite ale corpului;
- impiedicând patrunderea țânțarilor în casa (plase protecție la ferestre/ uși);
- utilizând substanțe insecticide în locuință /în jurul locuinței;
- utilizând în locuință aerul condiționat;
- utilizând plase împotriva țânțarilor în jurul paturilor, în cazul în care nu sunt disponibile celelalte măsuri menționate anterior sau dacă dormiți în aer liber;
- acoperind patuțul copilului sau căruciorul cu plase împotriva țânțarilor.

Care sunt simptomele contactării virusului?

La majoritatea oamenilor nu există simptome.

Aproximativ 80% dintre persoanele infectate cu virus West Nile nu prezintă niciun fel de manifestări. Unele persoane, până la 20% dintre cei infectați, pot prezenta o formă ușoară de infecție manifestată prin febră, dureri de cap, dureri de corp, greață, vomă și uneori creșterea în volum a ganglionilor limfatici și erupție cutanată pe fața anterioară și posterioară a toracelui și abdomenului. Un procent mic de persoane, aproximativ 1 din 150 infectate, pot dezvolta forma severă a bolii, de fapt o meningo-encefalită, manifestată prin febră ridicată, dureri de cap, redoarea cefei, dezorientare, comă, convulsii, slăbiciune musculară, pierderea vederii, pierderea sensibilității și paralizie, simptomatologie ce poate persista, iar afectarea neurologică poate lăsa sechele.

În cazul simptomelor severe se recomandă prezentarea de urgență la medic .

Direcția de Sănătate Publică a județului Arad a informat unitățile administrativ teritoriale și rețeaua medicală (medici de familie, neurologie, medici de la serviciul de urgențe, boli infecțioase etc.) despre măsurile pentru combaterea și controlul populației de țânțari, respectiv măsurile de întărire în supravegherea infecției cu virus West și cazurile confirmate până la acest moment.

DIRECTOR EXECUTIV
JR. CĂTANĂ CONSTANTIN

